

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β΄ ΦΑΣΗ

E_3.Γλ1(α)

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015
Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Βλέπε απόδειξη σχολικού βιβλίου σελίδα 62, Θεώρημα II.
A2. Βλέπε ορισμό σχολικού βιβλίου σελίδα 113.
A3. α.→Λ, β.→Λ, γ.→Σ, δ.→Λ, ε.→Σ

ΘΕΜΑ Β



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β΄ ΦΑΣΗ

E_3.Γλ1(α)

B1. Επειδή το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές ισχύει:

$$\hat{B} = \hat{\Gamma} \text{ (1)}. \text{ Επίσης } \hat{B}_1 = \hat{B}_2 = \frac{\hat{B}}{2} \text{ και } \hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma}_2 = \frac{\hat{\Gamma}}{2}.$$

$$\text{Άρα } \hat{B}_1 = \frac{\hat{B}}{2} = \frac{\hat{\Gamma}}{2} = \hat{\Gamma}_1.$$

Οπότε $M\Gamma = MB$ και έτσι το τρίγωνο $BM\Gamma$ είναι ισοσκελές.

B2. Συγκρίνουμε τα τρίγωνα BME και $\Gamma M\Delta$. Αυτά έχουν:

$MB = M\Gamma$ (λόγω B1.)

$\hat{BME} = \hat{\Gamma M\Delta}$ (ως κατακορυφήν)


$$\hat{B}_2 = \hat{\Gamma}_2$$

Από το κριτήριο Γ - Π - Γ τα τρίγωνα είναι ίσα. Οπότε και τα υπόλοιπα κύρια στοιχεία τους είναι ίσα. Άρα $ME = M\Delta$ και $BE = \Gamma\Delta$ (2). Όμως $AB = A\Gamma$ (3).

Αφαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (2) έχουμε

$$AB - BE = A\Gamma - \Gamma\Delta \Leftrightarrow AE = A\Delta.$$

ΘΕΜΑ Γ



Γ1. Γνωρίζουμε από υπόθεση ότι $\hat{\Delta}_1 = \hat{\Delta}_2 = \frac{\hat{\Delta}}{2}$. (1)

Επίσης ισχύει $\hat{\Delta}_2 = \hat{A\hat{E}\Delta}$ (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων AB και $\Gamma\Delta$ με τέμνουσα τη ΔE). (2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε ότι $\hat{\Delta}_1 = \hat{A\hat{E}\Delta}$.

Άρα $A\Delta = AE$, οπότε το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β΄ ΦΑΣΗ

E_3.Γλ1(α)

- Γ2.** Από το ερώτημα Γ1 ισχύει $A\Delta = AE$.
 Στο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ ισχύει ότι $A\Delta = B\Gamma$.
 Άρα $AE = B\Gamma$.
 Όμως το E είναι μέσο της AB οπότε ισχύει $AE = \frac{AB}{2}$.
 Εντέλει $B\Gamma = \frac{AB}{2} \Leftrightarrow AB = 2B\Gamma$.

- Γ3.** Στο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ ισχύει: $\hat{A} + \hat{\Delta} = 180^\circ$
 Όμως $\hat{A} = 2\hat{\Delta} \Leftrightarrow 3\hat{\Delta} = 180^\circ \Leftrightarrow \hat{\Delta} = 60^\circ$ Άρα $\hat{\Delta}_2 = \frac{\hat{\Delta}}{2} = 30^\circ$.
 Έτσι στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔEZ ισχύει ότι $EZ = \frac{\Delta E}{2} \Leftrightarrow \Delta E = 2EZ$.

ΘΕΜΑ Δ



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Γλ1(α)

Δ1.

• Γνωρίζουμε από υπόθεση ότι: $\hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma}_2 = \frac{\hat{\Gamma}}{2}$ (1) και $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = \frac{\Delta\hat{A}B}{2}$ (2)

• Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: $\hat{\Gamma} = 90^\circ - \hat{B}$ (3).

• Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ ισχύει: $\Delta\hat{A}B = 90^\circ - \hat{B}$ (4).

Από τις σχέσεις (1),(2),(3),(4) έχουμε: $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = \hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma}_2 = \frac{\hat{\Gamma}}{2}$ (5).

• Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΓΖΔ ισχύει:

$$\hat{\Gamma}\hat{Z}\Delta = 90^\circ - \hat{\Gamma}_2 = 90^\circ - \frac{\hat{\Gamma}}{2}.$$

Όμως $\hat{\Gamma}\hat{Z}\Delta = \hat{A}\hat{Z}K$ (ως κατακορυφή).

$$\text{Άρα } \hat{A}\hat{Z}K = 90^\circ - \frac{\hat{\Gamma}}{2}.$$

$$\text{Έτσι στο τρίγωνο } \hat{A}\hat{Z}K \text{ ισχύει: } \hat{A}_1 + \hat{A}\hat{Z}K = \frac{\hat{\Gamma}}{2} + 90^\circ - \frac{\hat{\Gamma}}{2} = 90^\circ$$

Οπότε $\hat{A}\hat{K}Z = 90^\circ$, οπότε $\hat{G}K \perp \hat{A}E$.

Δ2. Στο τρίγωνο ΑΓΕ ισχύει ότι τα ΑΚ, ΑΔ είναι ύψη του. Οπότε το σημείο Ζ είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου. Έτσι η ΕΖ είναι ο φορέας του τρίτου ύψους του. Άρα $EZ \perp AG$. Όμως $AB \perp AG$ και έτσι $EZ \parallel AB$.

Δ3. Εφόσον η ΓΚ είναι ύψος και διχοτόμος του τριγώνου ΑΓΕ, το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές και έτσι η ΓΚ είναι διάμεσος. Άρα το Κ είναι μέσο της ΑΕ. Ομοίως η ΑΚ είναι ύψος και διχοτόμος του τριγώνου ΑΖΛ. Οπότε το τρίγωνο ΑΖΛ είναι ισοσκελές. Έτσι το Κ είναι μέσο της ΖΛ. Άρα οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου ΖΕΛΑ διχοτομούνται και λόγω του ερωτήματος Δ1 είναι κάθετες. Οπότε το τετράπλευρο ΖΕΛΑ είναι ρόμβος.

Δ4. Στο τρίγωνο ΑΖΛ το Κ είναι το μέσο της ΖΛ και ισχύει $KN \parallel AL$. Άρα το Ν είναι μέσο της ΑΖ. Έτσι $KN = \frac{AL}{2} = \frac{EL}{2}$. Εναλλακτικά στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΖ, η ΚΝ είναι διάμεσος. Οπότε $KN = \frac{AZ}{2} = \frac{EL}{2}$.